

定期予防接種 計画表

◆標準的なスケジュールと注意点は次のとおりですので接種計画の参考にしてください。

- 予防接種は境港市が委託している医療機関で事前に予約し受けましょう
- 接種の順序や日程は、お子さんの体調、病気の流行状況を見て、かかりつけ医と相談し進めましょう
- 「予防接種と子どもの健康」を読みましょう

生後

2か月～

ロタウイルス

推奨する接種期間：初回を生後2か月に至った日から、生後14週6日後までに接種
それ以降の初回接種はおすすめしません。

- ※ワクチンの種類によって回数等が異なります
- ロタリックス（2回）：生後6週から生後24週（約5か月半）まで
- ロタテック（3回）：生後6週から生後32週（約7か月半）まで

小児用肺炎球菌

推奨する接種期間：生後2か月から5歳未満
※接種開始年齢により回数が異なります

B型肝炎

推奨する接種期間：1回目：生後2か月、2回目：生後3か月、3回目：生後7～8か月
※1歳の誕生日前日までに接種しましょう

五種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ）

推奨する接種期間：生後2か月から90か月未満
※1期初回接種（3回）は、生後12か月までに終了しましょう
※1期追加接種（1回）は、1期初回終了後6か月から1年6か月に達するまでに終了しましょう

5か月

BCG

推奨する接種期間：生後5～8ヶ月
※1歳の誕生日までに接種しましょう

1歳

麻しん・風しん（1期）

推奨する接種期間：1歳から2歳未満
※感染力が強く非常に強いウイルスです。1歳になったらすぐに接種しましょう。

水痘（水ぼうそう）

推奨する接種期間：1歳から3歳未満
※半年～1年の間隔をおいて2回接種しましょう

3歳

日本脳炎（1期）

推奨する接種期間：36か月（3歳）から90か月未満
※生後6か月から接種可能ですのでかかりつけ医と相談しましょう
※1期初回（2回）、1期追加（1回）接種します

年長さん

麻しん・風しん（2期）

推奨する接種期間：小学校に入学する前の1年間（年長児）の間
※小学校入学までに必ず接種しましょう

9歳

日本脳炎（2期）

推奨する接種期間：9歳以上13歳未満

11歳

二種混合（ジフテリア・破傷風）

推奨する接種期間：11歳以上13歳未満

中学1年

子宮頸がん(女子のみ)

推奨する接種期間：中学1年生
※小学6年～高校1年（16歳相当）の女子が接種できます
※平成25年6月以降、積極的な勧奨を差し控えておりましたが、令和4年4月から積極的な勧奨が再開されました。